

## 대장내시경 동의서

검사 목적

대장내시경 검사는 내시경을 이용하여 대장의 용종, 대장암, 염증성질환, 기타질환을 진단하고 조직검사 및 제거를 하는 검사입니다.

주의사항

- 1) 아스피린, 디클로피딘, 와파린 등의 항혈소판제 또는 항응고제를 복용중일 경우 조직검사나 용종절제시 출혈의 위험이 있습니다. 반드시 처방한 의사와 사전협의 후 1주일 전 복용을 중단하여 검사 가능하므로 예약시 반드시 알려주시기 바랍니다.
- 2) 인슐린을 주사하는 분은 담당의사와 상의하신 후 검사 당일 아침부터 주사하지 마십시오.
- 3) 당뇨약을 드시는 분은 건강진단 당일 아침에는 복용하지 마십시오.
- 4) 항고혈압제, 항경련제를 드시는 분은 대장내시경 당일 아침 일찍 최소량의 물과 함께 복용하십시오.

관련 합병증

내시경 검사 후 일시적인 복통 및 팽만감이 있을 수 있으며, 드물지만 천공(0.03%), 복막염, 장출혈 등이 발생할 수 있습니다. 검사 후 복부가 딱딱해지며, 극심한 복통, 지속적 혈변 및 설사, 현기증, 오심, 구토, 창백함, 식은땀 등이 나타나면 응급시술 또는 수술이 필요할 수 있으므로 본원으로 연락을 주시거나 인근 응급실로 연락 바랍니다.

대장내시경 동의서

www.komnet.org

내시경 검사시 주의해야 하는 경우 (반드시 V 체크하시기 바랍니다.)

약물 및 음식 과민증 (항생제, 마취제, 수면제, 달걀, 콩, 아황산염, 설탕 등)	
심혈관 질환 (협심증, 심근경색증, 부정맥)	
신장 질환 (만성 사구체신염, 신부전)	
간 질환 (만성 간염, 알콜성 간염, 간경변증)	
호흡기 질환(수면-무호흡증, 천식, 만성폐쇄성 폐질환, 심한 코골이, 감기)	
전립선 비대증	
녹내장	
고혈압	
갑상선 질환	
항응고제 복용(아스피린, 코마딘, 와파린)	
임신/ 임신가능성/ 수유중	

## 대장내시경 과거력

## 수술 병력 (복부수술 등)

검사 중 정확한 진단을 위하여 조직검사 및 내시경 용종절제술이 필요할 수 있으며 추가비용이 발생합니다.

상기 검사의 필요성, 내용, 예상 합병증 등에 대하여 설명을 들었으며, 불가항력적인 합병증이나 특이체질로 인한 우발적 사고에 대하여 충분히 이해하고, 검사를 신청합니다.

20 년 일 일

환자 : (인)

환자와의 관계 :                      보호자(법정대리인) 서명 :                      (인)



# 대장내시경검사를 위한 안내문

## 검진 7일전 주의 사항

처방한 의사와 사전협의 후 1주일 전에 아래의 약품은 중단해야 합니다.  
: 항응고제(아스피린, 아스트릭스, 와파린, 티클로피딘, 클로피도그렐, 디피리다몰 등)  
-> 혈압약에 아스피린 포함되어 있는지 확인 바랍니다.

## 검진 3일전 주의 사항

씨있는 과일(딸기, 수박, 참외, 키위, 포도 등), 해조류(김, 미역, 다시마 등), 잡곡류(현미, 흑미, 검정콩, 깨 등), 아재빵, 섬유질이 많고 질긴 음식(나물류, 뿌리음식, 고기류 등), 녹즙은 드시지 마십시오.

## 오전 검진

검사 전날 점심	검사 전날 점심은 가볍게 미음 또는 흰죽으로 드시고(반찬 드시지 마세요), 식사 후에는 물, 꿀물, 이온음료를 제외하고는 금식하십시오.
검사 전날 (오후 7시)	① 돌코락스 2알을 드신 후 바로 이어서 코리트액을 드십시오. ② 코리트액 만드는 방법: 분말 1포를 물병에 넣은 후 500cc 표시선까지 물을 채운 후 잘 흔들어 주시기 바랍니다. ③ 코리트액 4병 복용 : 신속하게 1컵(500cc)씩 10분간격으로 계속 복용합니다.
검사 당일 (오전 5시)	① 코리트액 4병 복용 : 신속하게 1컵(500cc)씩 10분간격으로 계속 복용합니다. ② 엔디액 : 마지막 약을 복용하신 후 드십시오

## 오후 검진

검사 전날 오후	검사 전날 저녁은 가볍게 미음 또는 흰죽으로 드시고(반찬 드시지 마세요), 식사 후에는 물, 꿀물, 이온음료를 제외하고는 금식하십시오. -> 검사 당일 금식입니다.
검사 당일 (오전 5시)	① 돌코락스 2알을 드신 후 바로 이어서 코리트액을 드십시오. ② 코리트액 만드는 방법: 분말 1포를 물병에 넣은 후 500cc 표시선까지 물을 채운 후 잘 흔들어 주시기 바랍니다. ③ 코리트액 8병 복용 : 신속하게 1컵(500cc)씩 10분 간격으로 계속 복용합니다. ④ 엔디액 : 마지막 약을 복용하신 후 드십시오.

구토, 탈수, 복통 증세가 심한 경우에는 복용을 중단하시고, 의사의 지시 없이 사용하지 마십시오.

